

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ/ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

SOFT TISSUE DEFECTS DUE TO SURGICAL WOUND DEHISCENCE/NECROSIS AFTER ORTHOPEDIC OPERATIONS

Βασιλείου Ανδρέας, Ευαγγελίδου Δώρα, Ρεκατσίνας Σπύρος, Καρατζιάς Άγγελος, Γιάλλουρος Χρυσόστομος, Κουλέρμου Γεωργία.

Vassiliou Andreas, Evangelidou Dora, Rekatsinas Spyros, Karatzias Angelos, Yiallouros Chrysostomos, Koulermou Georgia.

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Κύπρος

Plastic Surgery Department and Burns Unit, Nicosia General Hospital, Cyprus

Παρά τον μεγάλο αριθμό εργασιών που έχουν γίνει από τότε που εκπονήθηκε η πρώτη παρουσίαση περιστατικού με διάσπαση/νέκρωση χειρουργικού τραύματος, τα χειρουργικά τραύματα εξακολουθούν ενίοτε να υφίστανται διάσπαση ή και νεκρώσεις. Αυτό εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, γιατί αποτελεί μια πολύ σοβαρή μετεγχειρητική επιπλοκή που έχει υψηλή νοσηρότητα.

Η αναδρομική αυτή μελέτη διερευνά τα περιστατικά με ελλείμματα μαλακών μορίων μετά από διάσπαση/νέκρωση ορθοπεδικών χειρουργικών τραυμάτων που νοσηλεύτηκαν στο τμήμα Πλαστικής χειρουργικής τα τελευταία 5 χρόνια.

Αναλύεται η αιτιολογία, ο τρόπος αντιμετώπισης (πρωτόκολλο θεραπείας), συντηρητική θεραπεία και χειρουργική αποκατάσταση.

Αναφέρονται οι χειρουργικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν (μυϊκοί, μσοδερματικοί κρημνοί, νησιδωτοί, τοπικοί περιστροφικοί και προωθητικοί κρημνοί, ελεύθεροι κρημνοί) και αξιολογείται το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.