

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΜΕ LPGF (LIQUID PHASE OF CONCENTRATED GROWTH FACTORS)

Γλιαρμή Ελευθερία¹, Batani Tiziano², Ταραμπέ Μιχάλης³

¹Χειρουργός, Αθήνα, Ελλάδα

²Βιολόγος Silfradent srl Sata Sofia (FC), Italy

³Πλαστικός Χειρουργός Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Η χρήση αυξητικών παραγόντων αποτελεί μία καταξιωμένη συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδο στην επούλωση δύσκολων τραυμάτων και ελκών και συνάμα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στην θεραπεία ακτινικών βλαβών του δέρματος με την μορφή της μεσοθεραπείας . Η χρήση της καινοτόμου μεθόδου LPGF (Liquid Phase Concentrated Growth Factors) αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην ανάπλαση του δέρματος και την πρόληψη, βελτίωση και εξάλειψη ακτινικών βλαβών.

Υλικά & Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας με 12 περιστατικά εφαρμογής της μεθόδου, η οποία περιγράφεται αναλυτικά σε όλες τις φάσεις παρασκευής και θεραπευτικής εφαρμογής. Η μέθοδος αποτελείται από τέσσερα βήματα:

- 1.Λήψη φλεβικού αίματος σε δυο φιαλίδια (σύνολο 18ml)
- 2.Φυγοκέντριση Medifuge (Εξειδικευμένο πρόγραμμα) για 13 λεπτά περίπου.
- 3.Απομόνωση των αυξητικών παραγόντων (2 ml από το κάθε φιαλίδιο)
- 4.Άμεση εφαρμογή αυτόλογης μεσοθεραπείας (4 ml LPGF)
- 5.Τρείς εφαρμογές. Δεύτερη εφαρμογή μία εβδομάδα μετά την πρώτη και η τρίτη 4 εβδομάδες μετά την δεύτερη.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά με εμφανή βελτίωση της υφής και χροιάς του δέρματος σε διάφορες βλάβες του δέρματος όπως ουλές ακμής, ρυτίδωση, δυσχρωσίες και ανάπλαση του δέρματος .

Συμπέρασμα: Η χρήση της αυξητικών παραγόντων με την μορφή του LPGF μία σύγχρονη αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία για την βελτίωση της ποιότητας του δέρματος και την επούλωση των τραυμάτων εύκολη στην παρασκευή και εφαρμογή και ιδιαίτερη οικονομική όσον αφορά το κόστος – όφελος της θεραπείας.