

## ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΩΝ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΤΗ 2010-2012

### STOMA COMPLICATIONS, OUR EXPERIENCE FOR THE YEARS 2010-2012

**Κόχυλας Νικόλαος**, Ζιουτος Κωνσταντίνος, Πρίγκουρης Σωτήριος  
Kohilas Nikolaos, Zioyτος Konstantinos, Prigouris Sotirios

Δ' Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός  
D Surgical Department, Evaggelismos General Hospital

**Εισαγωγή:** Η δημιουργία μιας στομίας στα πλαίσια μιας επέμβασης του πεπτικού αποτελεί ένα υπαρκτό πρόβλημα και πολλοί ασθενείς επιβαρύνονται με μια μόνιμη ή προσωρινή στομία. Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η μελέτη των επιπλοκών, άμεσων ή απώτερων, που παρουσιάστηκαν στην κλινική μας από τη δημιουργία στομίας τα έτη 2010-2012.

**Υλικό:** Μελετήθηκαν οι στομίες που δημιουργήθηκαν στην κλινική μας τα έτη 2010-2012. Συγκεκριμένα , 1 loop ειλεοστομία, 6 loop εγκαρσιοστομίες, 4 loop σιγμοειδοστομίες, 16 τελικές κολοστομίες κατά Hartmann, 18 κοιλιοπερινεϊκές εκτομές του ορθού και 3 τελικές ειλεοστομίες. Follow up 6 μήνες έως 3 έτη.

**Αποτελέσματα:** Παρατηρήθηκαν μία κήλη παρά τη στομία, κήλη στο σημείο προηγούμενης στομίας, ένα περιστατικό αιμορραγίας, ένα περιστατικό νέκρωσης της στομίας που οδήγησε σε ειστροφή και στένωση αυτής. Επίσης παρουσιάστηκαν 2 επεισόδια ερεθιστικής δερματίτιδος, δύο περιπτώσεις κυτταρίτιδας πέριξ της στομίας και μία περίπτωση αλλεργικής δερματίτιδος από το σάκο κολοστομίας. Τέλος, μία περίπτωση diversion colitis δυσχέρανε την επανεπέμβαση για αναστροφή μίας Hartmann και ένας ασθενής με νόσο Crohn και τελική ειλεοστομία επανήλθε με αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

**Συμπέρασμα:** Η δημιουργία μίας στομίας αποτελεί ένα καθησυχαστικό παράγοντα για το χειρουργό, ο οποίος δε θα ανησυχεί για μια, πιθανώς επισφαλή, εντεροεντερική αναστόμωση. Δεν πρέπει να λησμονείται όμως ότι οι στομίες, πέραν της επιβάρυνσης που επιφέρουν στη ζωή του ασθενούς και του γεγονότος ότι απαιτείται μία δεύτερη επέμβαση για την αναστροφή τους, συνεπάγονται το δικό τους φάσμα επιπλοκών.