

ΛΟΙΜΩΞΙΟΓΟΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ

**Μπρισιτιάνου Μαγδαληνή-*Γεωργίου Χρήστος-*Κατσιμάνης Κωνσταντίνος-
 *Εμμανουηλίδης Ιωάννης-*Μπαϊλή Ευστρατία-***Μύτης Γεώργιος**

*Χειρουργικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

**Παθολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Τα τελευταία δύο (2) έτη (2011 και 2012),συγκεντρώσαμε όλες τις λοιμωξιόγόνες βλάβες δέρματος και μαλακών μορίων,που νοσηλεύτηκαν στη Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Λαμίας, προκειμένου να καταγράψουμε το είδος της βλάβης και τα επιδημιολογικά στοιχεία, που θα μας οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Έτσι το 2011 νοσηλεύτηκαν στη Χειρουργική κλινική 81 ασθενείς, εκ των οποίων 47 ήταν άνδρες και 34 γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 59,04 έτη. Το εύρος ηλικιών ήταν (13-100) για τους άνδρες και (21-92) για τις γυναίκες Ο μέσος όρος ηλικίας για τους άνδρες ήταν 59,68 έτη και για τις γυναίκες 56,49 έτη .Ο Μ.Ο. νοσηλείας σε ημέρες ήταν 9,2.

Το 2012 νοσηλεύτηκαν στη Χειρουργική κλινική 121 ασθενείς, 68 άνδρες και 53 γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας 64,1 έτη.Το εύρος ηλικίας ήταν (17-90) για τους άνδρες και (23-102) για τις γυναίκες.Ο Μ.Ο. ηλικίας των ανδρών ήταν 66,74 έτη και των γυναικών 60,55 έτη.Ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 8,6 ημέρες.

Είδος βλάβης	Αριθμός ασθενών 2011	Αριθμός ασθενών 2012
Εγκαύματα	5	6
Κυτταρίτις	15	18
Φλέγμων	30	42
Διαβητικό Πόδι	20	43
Ιδρωταδενίτις	1	1
Απόστημα μαλακών μορίων	1	0
Ερυσίπελας	4	2
Άτονα έλκη	2	4
Δοθιήνας	1	0
Κατακλίσεις	2	2
Πυοδερματίτις	0	0
Διαπύηση τραύματος	0	3
ΣΥΝΟΛΟ	81	121
Διαφόρου τύπου ακρωτηριασμοί	11	16

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών ασθενών, ως και ο απόλυτος αριθμός αυτών, είναι μεγαλύτερος των γυναικών.
- Σημειώνεται αύξηση των εισαγωγών κατά 49,3% τα έτη 2011 και 2012.
- Ο φλέγμονας αποτελούσε το 37% των εισαγωγών το 2011 έναντι 34,7% το 2012
- Το Διαβητικό Πόδι αποτελούσε το 24,7% των εισαγωγών το 2011 και το 35,5% το 2012.
- Συνολικά φλέγμονας και διαβητικό πόδι αποτελούσαν το 61,7% των εισαγωγών το 2011 και το 70,2% το 2012.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

- Διαπιστώνεται η συνεχώς αυξανόμενη τάση του Σ.Δ. τύπου II καθώς και η εξ αυτού αύξηση των επιπλοκών του.
- Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος νοσηλείας (έμμεσα) τόσο από το χρόνο νοσηλείας όσο και από την επιβολή σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των ασθενών.
- Δεδομένου ότι το 2010 διενεργήθηκαν 24 ακρωτηριασμοί όλων των τύπων το 2011 μόνο 11 και το 2012 ανήλθαν στους 16, διαπιστώνεται ότι το 2011 είχαμε μείωση του αριθμού των ακρωτηριασμών σε σχέση με το 2010 στο 45,83% και στο 66,66% το 2012. Μεταξύ των ετών 2011 και 2012 είχαμε σχετική αύξηση κατά 20,83%, που αναλογικά οφείλεται και στην αύξηση κατά 49,38% στις εισαγωγές των ασθενών στην κλινική μας