

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

RECONSTRUCTION OF CONTOUR DEFORMITIES OF THE FACE IN A PATIENT WITH SCLERODERMA WITH AUTOLOGUS FAT INJECTION

Σταμπολίδης Νεκτάριος, Αργυράκος Θεόδωρος, Παλλαντζάς Αθανάσιος, Κουράκος Παναγιώτης, Φάσσαρης Ανδρέας, Καραγκούνης Γεώργιος, Δημητρούλη Αικατερίνη, Τσαρουχά Κωνσταντίνα, Καστανά Ουρανία

Stampolidis Nektarios, Argyrakos Theodoros, Pallantzas Athanasios, Kourakos Panagiotis, Fassaris Andreas, Karagkounis George, Dimitrouli Aekaterini, Tsaroucha Konstantina, Castana Ourania

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Το σκληρόδερμα είναι ασυνήθης διαταραχή του συνδετικού ιστού χαρακτηριζόμενη από φλεγμονώδεις και ινωτικές αλλοιώσεις. Επιπρόσθετα, είναι νόσος αγνώστου αιτιολογίας.

Το εντοπισμένο γραμμικό σκληρόδερμα αποτελεί υπότυπο του σκληροδέρματος. Ατροφικές αλλοιώσεις παρατηρούνται αρχικά στο δερμοϋποδόριο ιστό και απώτερα στους μυς καθώς και στον υποκείμενο οστεοχόνδρινο σκελετό. Ποικίλες επεμβατικές τεχνικές όπως μόσχευμα δέρματος, δερματικός κρημνός, λίπος, οστικό μόσχευμα, ενθέματα, συνθετικά υλικά έχουν περιγραφεί για τη διόρθωση της συγκεκριμένης δυσμορφίας. Απόλυτα ικανοποιητικό θεραπευτικό μοντέλο δεν υπάρχει, ωστόσο συνίσταται, περίοδος αναμονής δυο ετών πριν τη χειρουργική αποκατάσταση.

Περιγράφεται περίπτωση 22 χρονης ασθενούς με αμφοτερόπλευρη ατροφία στη ζυγοματοπαρειακή περιοχή του προσώπου. Η δυσμορφία διορθώθηκε με τη χρήση αυτόλογης μεταμόσχευσης λίπους, που λήφθηκε μετά από λιποαναρρόφηση κατά τον ίδιο χρόνο, από την περιοχή της οσφύος.

Το αποτέλεσμα, από απόψεως αισθητικής και λειτουργικής πλευράς, ήταν άριστο δίχως επιπλοκές στο 24μηνο follow up.