

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Σουλτάνης Κ.Μ, Κατσαρίδης Σ, Γεωργίου Χ, Αργυρίου Μ, Χαρίτος Χ.
B Καρδιοχειρουργικό Τμήμα ΠΓΝ «ο Ευαγγελισμός»

Η λεμφόρροια μηροβουβωνικής χώρας είναι μία ενοχλητική και δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή μετά από παρασκευή των μηριαίων αγγείων. Αυξάνει το χρόνο νοσηλείας του ασθενούς, ενώ μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του τραύματος ή ακόμη και διαταραχές θρέψης. Η συχνότητα εμφάνισης φαίνεται να είναι συχνότερη στις περιπτώσεις εκείνες που η περιοχή έχει χειρουργηθεί ξανά κατά το παρελθόν και συναντάται σε ένα ποσοστό 1%-4%. Η αντιμετώπιση της λεμφόρροιας αποτελεί σήμερα ένα σύνθετο πρόβλημα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που προτείνονται περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως κλινοστατισμός, προφυλακτική χορήγηση αντιβίωσης, πιεστική περίδεση, πολλαπλές αναρροφήσεις του τραύματος, εφαρμογή σκληρυντικών παραγόντων, ακτινοβολίας, εφαρμογής συνεχούς αρνητικής πίεσης στο τραύμα, αλλά και χειρουργικής αντιμετώπισης. Παρουσιάζουμε 3 περιπτώσεις ασθενών που υπεβλήθησαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση το τελευταίο έτος στην κλινική μας με καθετηριασμό των μηριαίων αγγείων οι οποίοι εμφάνισαν λεμφόρροια από το μηροβουβωνικό τραύμα και επιχειρούμε μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής επιπλοκής.