

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

AUTOLOGUS FAT INJECTION FOR THE CORRECTION OF CONTOUR DEFORMITIES OF THE RECONSTRUCTED BREAST AFTER MASTECTOMIES

Παναγιώτης Κουράκος, Σταμπολίδης Νεκτάριος, **Στασινόπουλος Ιωάννης**, Όλγα Κισκήρα, Ανταλοπούλου Αικατερίνη, Βασιλάκη Εμμανουέλα, Κοκκινάκης Κωνσταντίνος, Ουρανία Καστανά

Panagiotis Kourakos, Stampolidis Nektarios, Stasinopoulos Ioannis, Olga Kiskira, Adalopoulou Aekaterini, Vasilaki Emmanuela, Kokkinakis Constantinos, Ourania Castana

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Η αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι η γυναίκα δεν βλέπει καθόλου την εικόνα του ακρωτηριασμένου εαυτού της και έτσι αποφεύγεται το έντονο ψυχολογικό τραύμα από την τραυματική επέμβαση της μαστεκτομής. Αυτό, αποτελεί στοιχείο που επιδρά θετικά στον ψυχισμό της ασθενούς και συμβάλλει σε μια περισσότερο αισιόδοξη αντιμετώπιση της νόσου και κατ' επέκταση στην ταχύτερη ανάρρωση.

Η ικανοποίηση των ασθενών με χειρουργική αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή μετά την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο μειώνεται όταν υπάρχουν δυσμορφίες στο περίγραμμα του μαστού που ανακατασκευάστηκε.

Για την διόρθωση του περιγράμματος του ανακατασκευασμένου μαστού μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται είναι η έγχυση αυτόλογου λίπους. Η τεχνική και η τεχνογνωσία της μεθόδου αυτής είναι πλέον και οι δύο τόσο δοκιμασμένες, που ουσιαστικά θεωρείται μια επέμβαση με σχεδόν μηδαμινή επικινδυνότητα και επιπλοκές χωρίς να είναι απαραίτητη η διαμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο.

Παρουσιάζεται ασθενής 46 ετών, στην οποία είχε γίνει αποκατάσταση του αριστερού μαστού μετά μαστεκτομή με κρημνό TRAM (εγκάρσιο ορθό κοιλιακό μυ), προ τριετίας. Στην ασθενή παρουσιάστηκε μια δυσμορφία τύπου step-off στο περίγραμμα του μαστού στην περιοχή της 3^{ης} ώρας προς το στέρνο.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε συλλογή λίπους με την τεχνική της λιποαναρρόφησης από την πλάγια κοιλιακή χώρα υπό τοπική αναισθησία και επανέγχυσή του μετά από ειδική επεξεργασία σε διάφορα σημεία του μαστού. Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό τόσο για την ασθενή όσο και από τον ιατρό.