

ΣΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κουμαρέλλας Κ, Καραμβέρι Χρ, Κοκκάλας Ι, Ζεβλας Α, Γεττίμης Ε
Α΄ Τμήμα Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Στη Γενική Χειρουργική είναι χρήσιμο η δημιουργία στομίας σε ασθενείς με συγκεκριμένες ενδείξεις που χειρουργούνται για καλοήθη ή κακοήθη νοσήματα του πεπτικού σωλήνα προγραμματισμένα ή έκτακτα.. Η επιλογή του είδους της στομίας εξαρτάται από την επιτελεσθείσα χειρουργική επέμβαση, το επείγον η μη του χειρουργείου αλλά και από τον άρρωστο (νόσημα και κατασκευή της κοιλίας). Την τελευταία 2ετία εκτελέσθηκαν στο Τμήμα μας 13 ειλεοστομίες, 14 εγκαρσιοστομίες και 30 κολοστομίες αριστερού κόλου. Επειγόντως εξετέλεσθη το 35% αυτών. Οι επιπλοκές που είχαμε αφορούσαν κατά κύριο λόγο το περιβάλλον δέρμα: ερεθισμός, εξέλκωση, αλλεργία στα υλικά κολοστομίας, ανώμαλο δέρμα λόγω παλαιότερων ουλών, πρόπτωση στομίας, νέκρωση χείλους στομίας και υδρική-ηλεκτρολυτική απορρύθμιση. Μόνο σε 2 περιπτώσεις χρειάστηκε χειρουργική αποκατάσταση(νέκρωση στομίας και πρόπτωση). Η συντηρητική αγωγή βελτίωσε έδωσε λύση στα περισσότερα προβλήματα. Συμπερασματικά: Η στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς με στομία είναι επιβεβλημένη για την έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση του αρρώστου. Η σωστή περιποίηση του περιβάλλοντος δέρματος από τους οικείους ή ειδικό θεραπευτή είναι κύριο μέσο στην πρόληψη προβλημάτων από τους ιστούς περί τη στομία.