

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

CONGENITAL ANALGESIA

Σταμπολίδης Νεκτάριος, Κουράκος Παναγιώτης, Στασινόπουλος Ιωάννης, Γιαννακίδου Μαρία, Μοστράτου Μαρία, Ευθυμίου Ιωάννα, Ιντζόγλου Ευθυμία, Καστανά Ουρανία

Stampolidis Nektarios, Kourakos Panagiotis, Stasinopoulos Ioannis, Giannakidou Maria, Mostratou Maria, Efthiou, Ioanna, Intzoglu Efthymia, Castana Ourania

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Η συγγενής αναλγησία (κληρονομική αισθητική και αυτόνομη νευροπάθεια τύπου IV) αποτελεί σπανιότατη κληρονομική διαταραχή του νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από αδυναμία αντίληψης επώδυνων και θερμικών ερεθισμάτων. Μεταβιβάζεται κατά τον υπολοιπόμενο αυτοσωματικό τύπο και πρωτοπεριγράφηκε το 1983. Χαρακτηρίζεται από ελαττωματική διαφοροποίηση της νευρικής ακρολοφίας με αποτέλεσμα απώλεια νευρικών ινών των ραχιαίων ριζών. Κλινικές εκδηλώσεις αποτελούν η απουσία αντίδρασης σε επώδυνα ερεθίσματα (μηχανικά ή θερμικά) με αποτέλεσμα υποτροπιάζοντες τραυματισμούς, εγκαύματα, δερματικές εξελκώσεις, δερματικές λοιμώξεις, διαταραχές επούλωσης, οστεοαρθροπάθειες, διαταραχές ανάπτυξης. Πέραν των κλινικών σημείων, η βιοψία δέρματος συνεπικουρεί στη διάγνωση.

Θεμελιώδους σημασίας στη θεραπεία της νόσου είναι η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση.

Παρουσιάζεται ασθενής 17 ετών με διεγνωσμένη συγγενή αναλγησία, εντοπιζόμενη στο κάτω ημιμόριο του σώματος, ο οποίος παρουσίασε αμφοτερόπλευρα ολικού πάχους θερμικά εγκαύματα πελμάτων μετά από βάδιση χωρίς παπούτσια σε πάτωμα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συνδυαστικά με τη χρήση ανθρώπινου υποκατάστατου χορίου και αυτομοσχεύματος μερικού πάχους σε δυο χρόνους με άριστα αποτελέσματα.