

Β' Παιδοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. κ. Αγλαΐας Κυριακού»

Σκοπός: Παρουσιάζουμε τον τρόπο αντιμετώπισης 167 παιδιών που πέρασαν από τα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία της Β' Χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» κατά τη χρονική περίοδο 2005-2006 λόγω αναφερόμενου δήγματος κυνός.

Υλικά-μέθοδος: Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 1-14 ετών με αναφερόμενο δήγμα από σκυλί, με τραύματα ποικίλης εντόπισης και βαρύτητας. Γίνεται ανάλυση της κατανομής των συμβάντων σε σχέση με τη χρονική στιγμή, το φύλο, την ηλικία, την εντόπιση και την ανάγκη ή όχι επιπλέον χειρισμών πέραν του απλού καθαρισμού και της χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής και προληπτικών μέτρων κατά του τετάνου.

Αποτελέσματα: Τα περισσότερα περιστατικά συνέβαιναν κατά τους θερμούς μήνες του χρόνου (Μάιος-Αύγουστος, n=78) και αφορούσαν κυρίως αγόρια με αναλογία 2:1. Η επίπτωση ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά σχολικής ηλικίας (2:1 σε σχέση με παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσος όρος ηλικίας 8,6 έτη). Τα τραύματα εντοπιζόνταν στα άκρα κατά στα 2/3 των περιπτώσεων (n=92, ποσοστό 55%), και ακολουθούσε η περιοχή του προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής (n=29). Σε 23 παιδιά χρειάστηκε περαιτέρω αντιμετώπιση πέραν της προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής και του καθαρισμού των τραυμάτων, ενώ 5 χρειάστηκαν εισαγωγή για χειρουργικούς καθαρισμούς και IV αγωγή. Η νοσηλεία διήρκεσε από 2-9 μέρες.

Συζήτηση-συμπέρασμα: Τα δήγματα κυνός είναι συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες, στα αγόρια και σε παιδιά σχολικής ηλικίας με συχνότερη εντόπιση τα άκρα. Βαρύτερα είναι τα τραύματα στο πρόσωπο. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συντηρητική, ενώ χειρουργική αντιμετώπιση χρειάζεται στα βαθιά και εκτεταμένα τραύματα ή για αισθητικούς λόγους.

4. ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ

Ζαπαντιώτη Π., Γκρεμούτης Γ., Παπαδόπουλος Στ., Οικονόμου Θ., Μπρούμη Π., Μπασακίδης Α., Τσούτσος Δ.

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων "Ι. Ιωάννοβιτς"
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"

Σκοπός: Οι διατατήρες δέρματος αποτελούν ευφυή και απλή μέθοδο αποκατάστασης με ευρεία εφαρμογή στη σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης ασθενών με μετεγκαυματικές ουλές με τη χρήση διατατήρων δέρματος.

Ασθενείς και Μέθοδος: Η παρούσα αναδρομική μελέτη αφορούσε ασθενείς με μετεγκαυματικές ουλές, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην Κλινική μας κατά την τελευταία τετραετία (2003-2006) και στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν διατατήρες δέρματος προς αποκατάσταση των ουλών. Μελετήθηκε ο αριθμός, το φύλο και η ηλικία των ασθενών, το αίτιο και η ανατομική εντόπιση της ουλής καθώς και τα αποτελέσματα από τη χρήση της μεθόδου. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργική αποκατάσταση δύο σταδίων. Κατά το πρώτο χειρουργικό στάδιο τοποθετήθηκε ο διατατήρας δέρματος, ενώ κατά το δεύτερο χειρουργικό στάδιο έγινε αφαίρεση της ουλής και κάλυψη

του ελλείμματος με τον ήδη διατεταμένο δερματικό κρημό. Ενδιάμεσα ο ασθενής υποβαλλόταν σε διαδοχικές διαδερμικές πληρώσεις του διατατήρα με φυσιολογικό ορό.

Αποτελέσματα: Αντιμετωπίστηκαν 27 ασθενείς. Οι 21 ήταν γυναίκες και οι 6 άνδρες, ηλικίας 18-45 ετών. Οι ουλές αφορούσαν το τριχωτό της κεφαλής, τον κορμό, τα άνω και κάτω άκρα. Στην πλειοψηφία των ασθενών το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Σε 1 ασθενή εμφανίστηκε φλεγμονή η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και σε άλλη 1 ασθενή έκθεση του διατατήρα. Στις 2 αυτές περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε η διάταση του δέρματος.

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή των διατατήρων δέρματος στην αντιμετώπιση ασθενών με μετεγκαυματικές ουλές αποτελεί μια αξιόπιστη λύση αποκατάστασης χωρίς σημαντικές επιπλοκές. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελούν τα δύο στάδια χειρουργικής παρέμβασης καθώς και οι επανειλημμένες διαδερμικές πληρώσεις του διατατήρα μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού όγκου.

5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Ο. Καστανά, Δ. Καρμίρη*, Β. Δασκάλου*, Δ. Αποστόλου*, Α. Γεωργούδη*,
Μ. Γιαννακίδου*, Δ. Αλεξάκης.

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής
*ΤΕΠ

Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισμός"

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να καταδειχθεί ότι μεγάλος αριθμός ασθενών απευθύνεται στα ΤΕΠ νοσοκομείων τριτοβάθμιας φροντίδας με παραμελημένα έλκη όταν πλέον έχουν ένα οξύ πρόβλημα που θα τους ανησυχίσει ή για λόγους κοινωνικούς.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελετήθηκαν ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου "ο Ευαγγελισμός" με παραμελημένα τραύματα, εγκαύματα, όγκους, άτονα έλκη ποικίλης αιτιολογίας και κατακλίσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ασθενείς απευθύνθηκαν στο ΤΕΠ όταν:

1. εμφάνισαν εμπύρετο λόγω φλεγμονής,
2. η οικογένεια απευθύνθηκε στο νοσοκομείο λόγω δυσσομίας του τραύματος,
3. ο πόνος από το τραύμα έγινε έντονος,
4. σε υπερήλικες που ζουν μόνοι ανακαλύφθηκε το πρόβλημά τους από συγγενείς ή γείτονες εκ των υστέρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καταδεινύεται η σημαντικότητα της γνώσης των ασθενών, να απευθύνονται άμεσα σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, η σπουδαιότητα της ύπαρξης οικογενειακού ιατρού καθώς και της έγκαιρης φροντίδας από εξειδικευμένο ιατρό ή νοσηλεύτη.

ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ»

ΩΡΑ: 12.30-14.00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΙΡΗ