



Συμπερασματικά, η χρήση του Σ.Α.Π. – V.A.C. ως πιεστική επίδεση στη μεταμόσχευση δέρματος αποτελεί μια αξιόπιστη θεραπευτική μέθοδο. Το μειονέκτημα του αυξημένου κόστους νοσηλείας αντισταθμίζεται με τα απόλυτα επιτυχή αποτελέσματα στη λήψη του μοσχεύματος και το πλεονέκτημα της άμεσης κινητοποίησης του ασθενούς. Νομίζουμε ότι απαιτείται κάποια μεγαλύτερης κλίμακας συγκριτική μελέτη, η οποία θα επέβαλε την εφαρμογή του Σ.Α.Π. – V.A.C ως εναλλακτική επίδεση στη μεταμόσχευση δέρματος.

#### 4. ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ RIEDEL ΚΡΗΜΝΟ

Ο. Καστανά, Μ. Γεωργακοπούλου, Α. Ψευδή, Ν. Νεοφώτιστος, Α. Καλογιάννη, Δ. Αλεξάκης.

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. “ο Ευαγγελισμός”

##### ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δερματικά ελλείμματα του ακρορινίου συνήθως καλύπτονται με τον κρημό Riedel.

Πολλές φορές όμως σε μεγαλύτερα ελλείμματα ή κατάφυση του έσω κανθού εμποδίζει την κινητοποίηση του κρημού. Προτείνεται μέθοδος τροποποίησης του κρημού, με την οποία η κινητοποίηση είναι μεγαλύτερη και καλύπτει μεγάλα ελλείμματα του ακρορινίου.

##### ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Παρουσιάζονται ασθενείς με ελλείμματα στο ακρορίνιο, κυρίως μετά από αφαίρεση όγκων όπου εφαρμόστηκε η προτεινόμενη μέθοδος.

##### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε σχέση με τον κρημό Riedel, κατά την τοποθέτηση του κρημού στο έλλειμμα δεν εμφανίζεται εξελκισμός του ακρορινίου προς τα πάνω και τα αισθητικά αποτελέσματα είναι καλύτερα.

##### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εύκολη παρασκευή του κρημού και τα καλά αισθητικά αποτελέσματα καθιστούν αυτόν ένα καλό κρημό για τα ελλείμματα του ακρορινίου.

#### 5. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Ο. Καστανά, Μ. Γεωργακοπούλου, Ν. Παπαρίζου, Ν. Νεοφώτιστος, Φ. Κατσιγιάννη, Δ. Αλεξάκης.

Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. “ο Ευαγγελισμός”

##### ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κάλυψη των ελλειμμάτων της οπίσθιας επιφάνειας του αγκώνα αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση αποκατάσταση με δέρμα άριστης ποιότητας. Ένας από τους τρόπους που παρέχει αυτή τη δυνατότητα είναι ο τυχαίος κρημνός της πλάγιας οσφυϊκής χώρας.

##### ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Παρουσιάζονται δύο ασθενείς με έλλειμμα αγκώνος όπου η αποκατάσταση έγινε με τον αναφερόμενο κρημό.

##### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν άριστα, λειτουργικά και αισθητικά.

##### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρ' ότι υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για την αποκατάσταση

του αγκώνα, η προτεινόμενη μέθοδος είναι αυτή που αφήνει τις λιγότερες παράπλευρες απώλειες και εμφανίζει πολύ καλά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

#### 6. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΚΝΩΤΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ

Ζαπαντιώτη Π., Γκρεμούτης Γ., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Στ., Μπασακίδης Α., Μπρούμη Π., Τσούτσος Δ.

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων “Ι. Ιωάννοβιτς” Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”

**Σκοπός:** Η παρουσίαση του τρόπου αποκατάστασης μετεγκαυματικών ελλειμμάτων και ρικνώσεων τα οποία αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας κατά την τελευταία τετραετία.

**Ασθενείς και Μέθοδοι:** Κατά την περίοδο 2003-2006 αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας 22 ασθενείς, ηλικίας 20-57 ετών. Οι 19 ήταν άνδρες και οι 3 γυναίκες με ελλείμματα ή ουλές που αφορούσαν: το γόνατο (2 ασθενείς), την κνήμη (1 ασθενής), τον άκρο πόδα (1 ασθενής), το πέος (2 ασθενείς), τη βουβωνική χώρα (1 ασθενής) το τριχωτό της κεφαλής (3 ασθενείς), τη μασχάλη (4 ασθενείς), το βραχίονα (2 ασθενής), την άκρη χείρα (2 ασθενείς), το λοβίο του ωτός (1 ασθενής), το μέτωπο-τριχωτό κεφαλής- βάση ρινός (1 ασθενής), τον τράχηλο (1 ασθενής) και περιστοματικά (1 ασθενής). Το αίτιο ήταν ηλεκτρικό έγκαυμα σε 7 ασθενείς.

**Αποτελέσματα:** Οι κρημοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:

Πλατύς ραχιαίος: για αποκατάσταση βραχίονα και μετώπου-τριχωτού κεφαλής- βάσης ρινός (2)

Έσω γαστέρα του γαστροκνημίου: για αποκατάσταση γόνατος (1) και κνήμης (1)

Προσθιοπλάγιος κρημνός του μηρού (ALT): για αποκατάσταση γόνατου (1)

TFL: για αποκατάσταση πέους (1) και βουβωνικής χώρας (1)

Ωμοπλατιαίος: για αποκατάσταση μασχάλης (1)

Παραωμοπλατιαίος: για αποκατάσταση μασχάλης (2)

Τοπικός περιστροφικός ή μεταθετός κρημνός: για αποκατάσταση τριχωτού (4), λοβίου του ωτός (1), πέους (1), άκρου ποδός (1), βραχίονα (1), τραχήλου (1), μασχάλης (1) και μεσοδακτύλιου διασπληνικού (1)

Venkatasaamhi: για αποκατάσταση αντίχειρα (1)

Κρημνός του σφιγκτήρος του στόματος: για αποκατάσταση περιστοματικά

Σε 2 ασθενείς εμφανίστηκε μερική νέκρωση του κρημού η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Στους υπόλοιπους ασθενείς η κλινική πορεία ήταν ομαλή με καλά λειτουργικά και ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα.

**Συμπεράσματα:** Η αποκατάσταση των ανωτέρω ελλειμμάτων και ρικνώσεων απαιτεί αποκατάσταση με χρήση κρημών, που αποτελούν τον μόνο αξιόπιστο τρόπο οριστικής επίλυσης του προβλήματος. Το ικανοποιητικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα αποζημιώνει τον ασθενή ο οποίος μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

#### 7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ FOURNIER : ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ